

ABSTRAK

SUSINTA ISMAIL, Pengaruh Terapi Kelompok Suportif Terhadap Kemampuan Mengatasi Halusinasi Pada Klien Skizofrenia Di RSUD Tombulilato. Di bimbing oleh FIRMAWATI sebagai ketua dan FADLI SYAMSUDDIN Sebagai Anggota.

Terapi Kelompok Suportif merupakan terapi yang terdiri dari beberapa orang-orang berencana, mengatur dan merespon secara langsung terhadap isu-isu dan tekanan maupun keadaan yang merugikan dan juga merupakan salah satu metode yang signifikan dalam mengatasi masalah halusinasi. Halusinasi yang dialami oleh individu dapat disebabkan oleh faktor presipitasi dan predisposisi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Terapi Kelompok Suportif Terhadap Kemampuan Mengatasi Halusinasi Pada Klien Skizofrenia Di RSUD Tombulilato. Desain penelitian *quasi experimental* dengan rancangan *group pretest – posttest one group design*. Pengambilan sampel menggunakan *total sampling* dengan 15 responden. Pengumpulan data menggunakan lembar observasi dengan hasil penelitian terdapat 15 (100%) responden dengan mengontrol halusinasi rendah sebelum diberikan terapi kelompok suportif sebanyak 12 (80.0%) Responden dan mengontrol halusinasi tinggi sebanyak 3 (20.0%) responden. Setelah diberikan terapi kelompok suportif mengontrol halusinasi rendah sebanyak 2 (13.3%) responden dan mengontrol halusinasi tinggi sebanyak 13 (86.7%) responden. Hasil uji statistic menggunakan uji *paired t-test* didapatkan nilai *p-value* =0.000 dengan $\alpha < 0.05$, terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh terapi kelompok suportif terhadap kemampuan mengatasi halusinasi pada klien skizofrenia. Diharapkan dengan adanya pengaruh terapi kelompok suportif bisa meningkatkan kemampuan mengatasi halusinasi pasien.

Kata Kunci : Halusinasi, Terapi Kelompok Suportif, Skizofrenia



ABSTRACT

SUSINTA ISMAIL, The Influence of Supportive Group Therapy on the Ability to Overcome Hallucinations in Schizophrenic Clients at RSUD Tombulilato. Supervised by FIRMAWATI as chairman and FADLI SYAMSUDDIN as a member.

Supportive Group Therapy is a therapy consisting of several people who plan, organize and respond directly to issues and pressures as well as adverse circumstances and is also a significant method of dealing with hallucination problems. Hallucinations experienced by individuals can be caused by precipitation and predisposing factors. The objective of research was to determine supportive group therapy on the ability to overcome hallucinations in schizophrenic clients at RSUD Tombulilato. Quasi-experimental research design with a group pretest – posttest one group design. Sampling used total sampling with 15 respondents. Data collection used an observation sheet with the results, there were 15 (100%) respondents controlling low hallucinations before being given supportive group therapy by 12 (80.0%) respondents and controlling high hallucinations by 3 (20.0%) respondents. After being given supportive group therapy, it controlled low hallucinations by 2 (13.3%) respondents and controlled high hallucinations by 13 (86.7%) respondents. Statistical test results used the paired t-test showed a p-value = 0.000 with $\alpha < 0.05$, there was a significant influence between the effect of supportive group therapy on the ability to overcome hallucinations in clients with schizophrenia. It is expected the influence of supportive group therapy can improve the ability to deal with patient hallucinations.

Keywords: *Hallucinations, Supportive Group Therapy, Schizophrenia.*

